

## **GRINLIST Mo** **Nawóz WE, dolistny roztwór nawozowy**

**komplekson molibdenu**

**Molibden (Mo) 30 g/l**



### **Dawki i terminy stosowania:**

<b>Rzepak:</b>	jesień, ruszenie wegetacji	2 x 0,2 l/ha
<b>Strączkowe:</b>	wykształcona rozeta, przed kwitnieniem	2 x 0,5 l/ha
	przed wysadzeniem rozsady (doglebowo)	1 l/ha
<b>Kalafior, kapusta:</b>	po przyjęciu rozsady	0,5 l/ha
	w okresie zwarcia międzyrzędzi	0,5 l/ha

**Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór molibdenu: truskawka, cebula, seler.**

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin molibdenem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie dawkować wg obowiązujących zasad. Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza: woda+ ewentualnie mocznik + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + mikroelementy.

### **Środki ostrożności:**

Nawóz może być szkodliwy w przypadku połknięcia lub dostania się do oczu. W takich sytuacjach miejsca podrażnione przemyć dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem. W przypadku rozlania nawóz zebrać.

### **Opakowania:**

Opakowania: 5l i 1l

### **Producent:**

PPH Agreko, 85-303 Bydgoszcz, ul. Piękna 13; tel./fax 52 581 17 84, tel. kom. 503 126 751