



GRINLIST Fe

Nawóz CE, dolistny roztwór nawozowy

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin żelazem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie, dawkować według obowiązujących zasad.

Żelazo (Fe) 70 g/l

Żelazo częściowo schelatowane organicznym kompleksorem



Opakowania:

5 l, 20 l



Dawki i terminy stosowania:

Rośliny rolnicze:	w fazie intensywnego wzrostu lub po wystąpieniu objawów niedoboru	od 1 do 2 l/ha
Drzewa owocowe:	wiosna, w czasie wypuszczania nowych pędów, na w pełni ukształtowane rośliny	Od 0,2 do 0,3% (Od 200 do 300 ml na 100 l wody)
Warzywa owocujące: ogórki, pomidory, papryka, dynie	od 6 do 10 liści	Od 0,2 do 0,3% (Od 200 do 300 ml na 100 l wody)
Inne warzywa, rośliny ozdobne:	w fazie intensywnego wzrostu, po nasadzeniu lub po wystąpieniu objawów niedoboru	Od 0,2 do 0,3% (Od 200 do 300 ml na 100 l wody)

Rośliny wrażliwe na niedobór żelaza: pszenica, kukurydza, len, lucerna, drzewa i krzewy owocowe, pomidory, ogórki, sałata, szpinak, bób i fasola.

Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza:

woda + **GRINLIST B (bor)** + ewentualnie mocznik + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + **NITROVIT** + **GRINLIST Fe** i pozostałe nawozy mikroelementowe linii **GRINLIST**.