



GRINLIST Mo

Nawóz CE, dolistny roztwór nawozowy

Wskazane łączenie dokarmiania dolistnego roślin molibdenem z wieloskładnikowymi nawozami dolistnymi i zabiegami ochrony roślin. W razie konieczności mocznik stosowany dolistnie, dawkować według obowiązujących zasad.

Molibden (Mo) 34,7 g/l
Azot (N) 8,9 g/l

Komplekson molibdenu

CE

Opakowania:

1 l, 5 l



Dawki i terminy stosowania:

| | | |
|--------------------|--|--------------|
| Rzepak: | jesień, ruszenie wegetacji | 2 x 0,2 l/ha |
| Strączkowe: | wykształcona rozeta, przed kwitnieniem | 2 x 0,5 l/ha |
| Kalafior, kapusta: | przed wysadzeniem rozsady (doglebowo) | 1 l/ha |
| | po przyjęciu rozsady | 0,5 l/ha |
| | w okresie zwarcia międzyrzędzi | 0,5 l/ha |

Pozostałe rośliny wrażliwe na niedobór molibdenu: truskawka, cebula, seler.

Kolejność mieszania komponentów w zbiorniku opryskiwacza:

woda + **GRINLIST B (bor)** + ewentualnie mocznik + pestycydy (fungicydy, insektycydy) + regulatory wzrostu + siarczan magnezu + **NITROVIT** + pozostałe nawozy mikroelementowe linii **GRINLIST**.